

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**Mucolysin[®] Skovbær 200 mg, brusetabletter**
Acetylcystein

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Mucolysin Skovbær nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle uger.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin Skovbær
3. Sådan skal du tage Mucolysin Skovbær
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mucolysin Skovbær er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Mucolysin Skovbær for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle uger.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MUCOLYSIN SKOVBÆR**Tag ikke Mucolysin Skovbær:**

- hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).
- hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Mucolysin Skovbær til børn under 5 år uden lægens anvisning

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Mucolysin Skovbær:

- Hvis du har astma eller tidligere har haft åndedrætsbesvær (bronkospasmer).
- Hvis du har eller har haft mavesår.
- Hvis du er særlig følsom over for histamin.

Vær opmærksom på følgende:

Mucolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin Skovbær.

Brug af anden medicin sammen med Mucolysin Skovbær

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge inden du tager Mucolysin Skovbær:

- Hvis du både er i behandling med Mucolysin Skovbær og visse antibiotika (f.eks. cephalixin og tetracyclin) bør du tage de to slags medicin med 2 timers mellemrum. Andre antibiotika, som f.eks. amoxicillin, doxycyclin, erythromycin, thiamphenicol og cefuroxim påvirkes ikke af Mucolysin Skovbær.
- Hvis du tager hostestillende medicin.
- Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin (nitroglycerin).

Brug af Mucolysin Skovbær sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin Skovbær i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du bør ikke tage Mucolysin Skovbær, hvis du er gravid. Tal med din læge.

Amning:

Du bør ikke tage Mucolysin Skovbær, hvis du ammer. Tal med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin Skovbær påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucolysin Skovbær

Mucolysin Skovbær indeholder 139 mg natrium pr. dosis (tablet). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MUCOLYSIN SKOVBÆR

Tag altid Mucolysin Skovbær nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosering er

Voksne:

1 brusetablet (200 mg) 3 gange daglig.

Børn over 5 år:

1 brusetablet (200 mg) 2 gange daglig.

Du må kun bruge Mucolysin Skovbær til børn under 5 år efter lægens anvisning.

Brugsanvisning:

Du skal opløse brusetabletten i et ½ glas vand.

Tag ikke Mucolysin Skovbær sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvnen.

Hvis du har taget for mange Mucolysin Skovbær

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin Skovbær, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Mucolysin Skovbær

Hvis du har glemt en dosis Mucolysin Skovbær, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Mucolysin Skovbær kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt husudslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Mundbetændelse, mavesmerter, diarre, opkastning, halsbrand og kvalme,
- Hovedpine og feber.
- Overfølsomhedsreaktioner (Hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Susen for ørerne (tinnitus)

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt, kløe (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Mucolysin Skovbær utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Mucolysin Skovbær ved temperaturer over 30°C.

Opbevar Mucolysin Skovbær i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt over for fugt.

Brug ikke Mucolysin Skovbær efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mucolysin Skovbær 200 mg indeholder:

Aktivt stof: Acetylcystein 200 mg

Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat vandfri; ascorbinsyre (E300); saccharinnatrium, natriumcyclamat (E952) og macrogol.

Brombæraroma: Maltodextrin, arabisk gummi (E414), propylen glykol (E1520) og ascorbinsyre (E300).

Skovbæraroma: Maltodextrin, arabisk gummi (E414) og propylen glykol (E1520).

Mucolysin Skovbærs udseende og pakningstørrelse

Udseende

Hvid, rund tablet med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Plastrør indeholdende 15, 25, 50 eller 100 brusetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 1. februar 2013