

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Strepsils med Honning og Citron, sugetabletter  
2,4-diklorbenzylalkohol 1,2 mg/amylnetakresol 0,6 mg

**Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger**

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger som lægen eller apotekspersonalet har givet dig

- \* Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- \* Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- \* Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her
- \* Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

**Nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).**

### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils med Honning og Citron
3. Sådan skal du bruge Strepsils med Honning og Citron
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

## **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Strepsils med Honning og Citron sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning. Strepsils med Honning og Citron anvendes mod øm og irriteret hals.

Lægen kan have givet dig Strepsils med Honning og Citron for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

## **2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE STREPSILS MED HONNING OG CITRON**

### **Brug ikke Strepsils med Honning og Citron**

- hvis du er allergisk over for diklorbenzylalkohol og/eller amylnetakresol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils med Honning og Citron

- Hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.
- Hvis du er diabetiker, da Strepsils med Honning og Citron indeholder 1,0 g glucose og 1,5 g saccharose pr. sugetablet.

### **Brug af anden medicin sammen med Strepsils med Honning og Citron**

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

### **Graviditet og amning**

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

### **Graviditet**

Du kan bruge Strepsils med Honning og Citron under graviditet.

### **Amning**

Du kan bruge Strepsils med Honning og Citron, selvom du ammer.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Strepsils med Honning og Citron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Strepsils med Honning og Citron indeholder glucose og saccharose, hvor advarsel er påkrævet**

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Strepsils med Honning og Citron kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug.

## **3. SÅDAN SKAL DU BRUGE STREPSILS MED HONNING OG CITRON**

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### **Den sædvanlige dosis er**

Voksne og børn over 6 år: 1 sugetablet hver 2.-3. time.

Børn på 6-11 år:

Lægemidlet skal administreres under en voksens opsyn

Børn under 6 år:

På grund af lægemidlets form skal administrationen

begrænses til børn over 6 år.

### **Ældre**

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

### **Hvis du har brugt for mange Strepsils med Honning og Citron**

Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven.

### **Hvis du har glemt at bruge Strepsils med Honning og Citron**

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

## 4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Sjældne bivirkninger:** Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Overfølsomhedsreaktioner med udslæt, prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme.
- Irritation i slimhinden kan udvikles ved længere tids brug.

**Meget sjældne bivirkninger:** Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

- Kvalme samt sure opstød / halsbrand

Der kan være cariesrisiko ved længere tids brug.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

## 5. OPBEVARING

Opbevar Strepsils med Honning og Citron utilgængeligt for børn.

Opbevar Strepsils med Honning og Citron i original emballage.

Brug ikke Strepsils med Honning og Citron efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Strepsils med Honning og Citron, sugetabletter indeholder:

- Aktive stoffer: Diklorbenzylalkohol og amylmetakresol.
- Øvrige indholdsstoffer: Flydende saccharose, flydende glucose, honning, vinsyre (E 334), citronolie (terpenfri), pebermynteolie.

### Udseende og pakningsstørrelser

Strepsils med Honning og Citron er en klar, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten.

Strepsils med Honning og Citron findes i blisterpakninger med 24 og 36 sugetabletter og i rør med 10 sugetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

103-105 Bath Road

Slough

Berkshire  
SL1 3UH  
England

Repræsentant

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S  
Vandtårnsvej 83A  
2860 Søborg  
Tel.: 4444 9701

Fremstiller

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited  
Thane Road  
Nottingham  
NG90 2DB  
England

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2013.**